

Tab. 10 Distribuzione percentuale delle diagnosi totalmente attribuibili all'alcol (*) per età. Anno 2002 (val. %)

Cause di dimissione (*)	Fino a 14 anni	15-35 anni	36-55 anni	Oltre 55 anni	Totale
Sindrome psicotiche indotte da alcool	0,0	12,0	49,1	38,9	100,0
Sindrome di dipendenza da alcool	0,1	19,7	52,5	27,7	100,0
Abuso di alcool	1,4	35,3	45,3	18,0	100,0
Polineuropatia alcoolica	0,0	4,6	46,8	48,6	100,0
Cardiomiopatia alcoolica	0,4	3,8	37,5	58,3	100,0
Gastrite alcoolica	0,5	11,3	39,3	48,9	100,0
Steatosi epatica alcoolica	0,0	8,2	39,3	52,5	100,0
Epatite acuta alcoolica	0,0	10,6	45,2	44,2	100,0
Cirrosi epatica alcoolica	0,0	1,7	31,5	66,7	100,0
Danno epatico da alcool, non specificato	0,1	7,3	41,0	51,6	100,0
Avvelenamento da antagonisti dell'alcool	0,0	30,4	56,5	13,0	100,0
Effetti tossici dell'alcool	16,8	33,7	28,9	20,6	100,0
Totale	0,3	12,8	42,9	44,1	100,0

(*) Sono state considerate sia la causa principale sia le cause secondarie.

Fonte: Ministero della Salute, "Relazione del Ministro della Salute al Parlamento sugli Interventi realizzati in materia di alcool e problemi alcolcorrelati (legge 30-3-2001, n 125)", anno 2004